

كالييندار ٧٠ دبليو بي CALENDAR 70 WP

مبيد عشبي جهازى إختيارى لمكافحة معظم الأعشاب
العريضة والرفيعة في محصول البطاطس والطماطم
على هيئة مسحوق قابل للبلل

المادة الفعالة : ميتريبوزين ٧٠% (وزن / وزن)

Metribuzin 70% (w/w)

(ابعد المبيد عن تناول الأطفال)

الإسعافات الأولية :

عند بلع المبيد : يستدعى الطبيب حالاً .

عند الاستنشاق : ينقل المصاب إلى الهواء الطلق بعيداً عن مكان التلوث .

عند ملامسة الجلد : تنزع الملابس الملوثة يغسل الجزء المصاب بالماء .

عند ملامسة العين : العين المصابة بالماء النظيف لمدة ١٥ دقيقة ويكمل العلاج من قبل الطبيب إذا لزم الأمر .

رقم التسجيل بالمملكة العربية السعودية : ١١٠٦ - ١٠ - ٤٨

Net Weight : 1 Kg

Prod. Date :

Exp. Date : 2 Years From Prod. Date

Batch No.:

الوزن الصافي : ١ كغم

تاريخ الإنتاج :

تاريخ الإنتهاء : سنتان من تاريخ الإنتاج

رقم الدفعة :

الشركة المنتجة : شركة هونبور

المنشأ : الصين

١ كيلو جرام
1 KG

الوزن الصافي Net Wt.

شركة الأسمدة المتحدة السعودية

المملكة العربية السعودية. ب. ٤٨١١- الرياض : ١١٤١٢
الرياض: هاتف: (٤٧٦٥٣٤١ / ٤٧٨١٢٨٧) - فاكس: ٤٧٢٢٣٣٩
جدة: ٢/٢٣١٦٦٨١ - تبوك: ٤/٤٢١٩٤٣٨
الخرج: ١/٥٥١٠٤٧٤ - جـرّان: ٧/٥٤٤٠٧٦٦
بريدة: ١/٣٨١١١٠١ - الدمام: ٣/٨٥٠٩٩١٩
حائل: ٦/٥٣٢١٧٨٣ - وادي الدواسر: ٣/١/٧٨٦٢٣٠٣
الجوف: ٤/١٢٨٣١١٩ - شـ سلام: ١/٢٨٦٥٨٨١



الوكيل :

الخواص والاستعمال :

كالييندار ٧٠ مبيد عشبي جهازى إختيارى يستعمل على البطاطس قبل الإنبات يستخدم على الطماطم المزروع بالشتل في الحقول المفتوحة فقط والبرسيم . لمكافحة الحشائش عريضة الأوراق وعشبة سميا (Poa annua) وللحصول على توزيع جيد للمبيد في منطقة الجذور يجب أن تكون التربة رطبة وأيضاً يجب أن تكون الطبقة السطحية للتربة محروثة جيداً .

طريقة تحضير محلول الرش :

إملاً نصف وعاء الرش بالماء ثم ضع الكمية المطلوبة من المسحوق في مصفاة وعاء الرش ثم أضف الكمية الباقية من الماء إلى المصفاة حتى يذوب المسحوق وأمزج جيداً .

نسبة الإستعمال :

المحصول	الوقت	الأعشاب	نوع التربة	معدل الاستخدام	فترة التحريم
البطاطس يتم الرش مرة واحدة فقط خلال المواسم	قبل الإنبات	الحشائش عريضة الأوراق وعشبة سميا Poa annua	خفيفة	٠,٧٥-٠,٥ كجم/هكتار	٦٠ يوم
			متوسطة أو ثقيلة	١,٠-٠,٧٥ كجم /هكتار	
			خفيفة متوسطة ثقيلة	٠,٥ كجم/هكتار	
البطاطس (يجب ألا يزيد طول الأعشاب عند المكافحة عن ٢,٥ سم)	بعد انبات البطاطس وحتى إرتفاع نبات البطاطس ٥سم وعند تخطي هذا الطول يحدث ضرر للنبات			٠,٥ كجم/هكتار	٤٢ يوم
الطماطم في الحقل المشكوف	بعد حوالي عشرة أيام من غرس الشتلات			٠,٥ كجم/هكتار	٣٨ يوم
البرسيم	في السنة الثانية من عمر المحصول وخلال طور السكون يستعمل فقط على البرسيم المزروع كعلف وليس على البرسيم المزروع للبدار			٠,٥ كجم/هكتار	

ملاحظات :

- إن معدلات الإستعمال الأدنى مخصصة للأراضي الخفيفة والمتوسطة والمعدلات الأعلى للأراضي الطينية .
- إن أفضل النتائج يمكن الحصول عليها عند إستعمال المبيد على التربة المفككة ذات الرطوبة السطحية حتى عمق (٣-٥سم) .
- يجب أن لايزيد معدل الإستخدام على أصناف البطاطس المبكرة عند ٠,٥ كجم/هكتار .
- لايتستخدم هذا المبيد على التربة الرملية التي تحتوي على أقل من ١% من مواد عضوية .
- قد يصاب البطاطس بالضرر إذا تم الرش بعد تجاوز إرتفاع النبات ٥سم .
- لايرش هذا المبيد إذا كانت درجة الحرارة أعلى من ٢٥ درجة م .
- لايسمح باستخدام هذا المبيد على الطماطم في البيوت المحمية .
- لايكافح هذا المبيد حشيشة الأفعى (Gallium aparine)
- يمكن زراعة القمح والشعير بعد مرور ٨ شهور من المعاملة بالمبيد اما المحاصيل الأخرى فلا تزرع إلا بعد مرور عام من المعاملة بالمبيد .
- يحذر الرعي في المناطق المعاملة بالمبيد أو اعاطائها علف للحيوان .

القابلية للخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات العشبية ولايقبل الخلط مع المبيدات العشبية المركبة العالية التركيز ينصح بعمل تجربة خلط معلى مساحة صغيرة قبل الخلط على مساحات كبيرة .

التخزين :

يحفظ المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة وبعيداً عن المواد الغذائية والأعلاف والأسمدة والبذور .

الضرر على البيئة والإنسان والحيوان :

غير ضار بالنحل والأسماك وشديد الضرر على الإنسان والحيوان الأليفة إذا ماتم إبتلاعه أو إستنشاقه وهو سام للحيوانات المائية ويحظر إضافته على المسطحات المائية أوالأراضي شديدة الرطوبة خشية حدوث تلوث بماء الأراضي الذي يستخدم للشرب .

أعراض التسمم :

عند حدوث الصداع والتعرق والغثيان والاقياء وآلام البطن وضيق في التنفس يجب إستدعاء الطبيب فوراً .

مضاد التسمم :

لايوجد مضاد معين معروف ويكون العلاج حسب الأعراض الظاهرة .

الاحتياطات :

- ١ - اتبع التعليمات المدونة على بطاقة المعلومات بدقة .
- ٢ - لبس الملابس الواقية (مئزر - حذاء - قبعة - قفازات - أقنعة) عند خلط أو استعمال المادة .
- ٣ - تجنب الرش أثناء إرتفاع درجات الحرارة أو هبوب الرياح أو أثناء توقع هطول الأمطار .
- ٤ - تجنب استنشاق أبخرة أو غبار المادة .
- ٥ - تجنب ملامسة المادة للجلد أو العين أو الفم .
- ٦ - لا تأكل أو تشرب أو تدخن عند استعمال المادة .
- ٧ - لاتستخدم الأوعية الفارغة ويتم التخلص منها ومن بقايا المادة بالحرق ثم الدفن في حفرة عميقة بعيداً عن المناطق السكنية .
- ٨ - غسل الجسم والملابس الواقية جيداً بالماء والصابون بعد الاستعمال .
- ٩ - غسل الات الرش بالماء بعد الاستخدام .

تحذير : يجب إتباع تعليمات الاستعمال والتخزين بدقة وإن الشركة المنتجة والموزع غير مسئولين عن نتائج سوء الاستعمال والتخزين .

Honbor Industrial Co., Ltd.

C Zone, 11/F International Trade Building.
No.3002, Renmin Rd. Shenzhen, P.R. China



Tel. : 866-755-8861689

Fax : 866-755-82210808

Made in China

