رادار ٥ اس جي
RADAR 5 SG

مبيد حشري على هيئة حبيبات قابلة للذوبان (SG)
المادة الفعالة : إمامكتين بنزويت ٥٪ (وزن /وزن)
Emamection - benzoate 5% w/w

«ابعد المبيد عن متناول الأطفال»

الإسعافات الأولية :

- عند البلع : عدم إحداث تقيؤ إلا بإشراف الطبيب ولايعطي الشخص الغائب عن الوعي أي شيء عن طرق الفم .
- عند الاستنشاق : ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية ويجري له التنفس اصطناعي ويتم استدعاء الطبيب .
- عند ملامسة العين : غسيل العينين بالماء لمدة ١٥ دقيقة على الأقل .
- عند ملامسة الجلد : يتم نزع الملابس الملوثة وغسل الجلد جيدا بالماء والصابون .

رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية : ١٠٢٣ - ١٠ - ٤١١

رقم الدفعة : Batch No.:

تاريخ الإنتاج : Prod. Date :

تاريخ الإنتهاء : سنتان من تاريخ الإنتاج Exp. Date : 2 Years From Prod. Date

الوزن الصافي : ٢٥٠ جرام Net Wgt. : 250gm

البلد المنتج : الصين .

الشركة المنتجة : شركة هونبور

شركة الأسمدة المتحدة السعودية ص.ب ٤٨١١-الريـــاض : ١١٤١٢
الرياض: هاتف : ٤٧٦٥٣٤١ / ٤٧٨١٢٨٧ - فاكس : ٤٧٢٢٣٣٩

الخواص :

- رادار ٥ اس جي مبيد حشري يعمل بالملامسة يستخدم لمكافحة يرقات حرشفية الاجنحة.

معدلات الاستخدام .

المحصول	الآفة	معدل الاستخدام	فترة التحريم
الخضروات المثمرة (الطماطم فلفل .باذنجان)	الديدان الورقية ديدان ثمار الطماطم Heliothis spp. Spodoptera spp صانعات الانفاق Liromyza spp	٢٠٠غم/هكتار	يوم واحد
القرعيات (خيار .كوسا . بطيخ .شمام)	الديدان الورقية ديدان ثمار الطماطم Heliothis spp. Spodoptera spp صانعات الانفاق Liromyza spp	٢٠٠غم/هكتار	٧يوم
الخضروات الورقية (الخس . السبانخ)	الديدان القارضة Heliothis spp. Spodoptera spp	٢٠٠-٢٥٠غم/ هكتار	٧يوم
العائلة الصليبية (زهرة . ملفوف)	عثة الظهر الماسي دودة الملفوف Flutella xylostella Pieris rapae	٢٠٠-٢٥٠غم/ هكتار	٧يوم
البطاطس	الديدان القارضة صانعات الانفاق Spodoptera spp Liromyza spp	٢٠٠غم/هكتار	٧يوم
البرسيم	الديدان القارضة Heliothis spp. Spodoptera spp	٢٠٠غم/هكتار	٧يوم

Honbor Industrial Co. Ltd.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية عدا التي لها تفاعل قلوي ، ويفضل إجراء تجربة مصغرة قبل الخلط بكميات كبيرة .

التخزين :

يحفظ المبيد في عبواته الأصلية المقفلة وفي مكان جاف بارد.جيد التهوية بعيداً عن الأغذية والأعلاف والأسمدة والبذور وبعيداً عن أشعة الشمس .

الأثر على البيئة :

المبيد غير سام للاعداء الحيوية وضار للإنسان والحيوان إذ ابتلع أو استنشق أولامس الجلد .

السمية للنحل :

يجب مراعاة مرور فترة ٢٤ ساعة من الرش قبل السماح للنحل بالرعي في الحقل المرشوش .

أعراض التسمم :

لاتوجد أعراض محددة .

مضاد التسمم :

لايوجد مضاد معروف وتتم المعالجة حسب الأعراض الظاهرية .

احتياطات :

١ - اتبع التعليمات المدونة على بطاقة المعلومات بدقة .
٢ - لبس الملابس الواقية (منزر - حذاء - قبعة - قفازات - أقنعة) عند خلط أو استعمال المبيد .
٣ - تجنب الرش أثناء ارتفاع درجات الحرارة أو هبوب الرياح أو أثناء توقع هطول الأمطار .
٤ - تجنب استنشاق أبخرة أو غبار المبيد .
٥ -تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العين أو الفم .
٦ - لا تأكل أو تشرب أو تدخن عند استعمال المبيد .
٧ - لاتستخدم الأوعية الفارغة ويتم التخلص منها ومن بقايا المبيد بالحرق ثم الدفن في حفرة عميقة بعيدا عن المناطق السكنية .
٨ - غسل الجسم والملابس الواقية جيدا بالماء والصابون بعد الاستعمال .
٩ - غسل آلات الرش بالماء بعد الاستخدام .

تنبيه :

يجب إتباع تعليمات الاستعمال والتخزين بدقة وأن الشركة المنتجة والوكيل والموزع غير مسئولين عن نتائج سوء الاستعمال والتخزين .

Caution