

Ronstar®_{25EC}



رونستار® ٢٥

الأطفال والمواد الغذائية والأعلاف ومصادر المياه.

الأثر على البيئة:

رونستار ٢٥ يبيد عشبى على هيئة سائل مركز قابل للإستعمال يستخدم قبل الإثبات أو بعد الإثبات بقدرة حفيف للقضاء على الأعشاب الرفعية الأوراق والعرشة وذلك في مراحل نموها الأولى والتي تنبت في محاصيل الصغيرة ونواح التحاليل غير ضارة كونها تكون قليلة جداً كما أن الأوكساديزون يختص من قبل المواد العضوية بالتنفس والهضم وبذلك لا يتحرك أفيما أو عموديا مع المياه الجارية مما ينبع عنه عدم تلوث المياه.

أعراض التسمم:

ليست هناك أي طواهر أو أعراض واضحة بسبب السمية الخفيفة للمبيد.

مضاد التسمم:

يحتاج المريض حسب الأعراض الظاهرة.

احتياطات:

1- اتبع التعليمات المدونة على بطاقة المعلومات بدقة.

2- ليس الملابس الواقعية (منizer، حذاء، قبعة، قفازات، أقنعة) عند خلط أو إستعمال المبيد.

3- غسل الريش أثناء إيقاف درجات الحرارة أو هبوب الرياح أو أثناء توقيع هطول الأمطار.

4- غسل إستنشاق أنفحة أو غبار المبيد.

5- غسل الملابس الميد للجلد أو العين أو الفم.

6- لا تأكل أو تشرب أو تدخن عند إستعمال المبيد.

7- لا يستخدم الأوعية الفارغة ويتم التخلص منها وفقاً للميد بالحرق ثم بالدفن في حفرة عميقه بعيداً عن الماء.

8- غسل الجسم والملابس الواقعية جيداً بالماء والصابون بعد الإستعمال.

9- غسل آلات الريش بالماء بعد الإستعمال.

تحذير:

يجب إتباع تعليمات الإستعمال وطرق التخزين والإحتياطات بدقة وأن الشركة المنتجة والوكيل والموزع غير مسؤولين عن نتائج سوء الإستعمال والتلف.

الإسعافات الأولية:

وضع المريض في الهواءطلق واستدعاء الطبيب.

عند ملامسة المدى: الغسل جيداً بالماء والصابون أو بكميات المسوبيوم تركيز ٥٪.

عند ملامسة العين: الغسل جيداً بالماء النظيف لمدة ١٠ - ١٥ دقيقة.

عند بقع الميد: إستدعى الطبيب فوراً إنمتنع عن إعطائه الحليب أو مواد دهنية.

رقم التسجيل بالمملكة العربية السعودية: ٢٧١ - ١٠٠ - ٧٢١.

Manuf. Date :

Expiry Date :

2 years from production date

Batch No :

ال الوزن الصافي : ١ لتر

النوع الصافي : Net Weight : ١L

إنتاج شركة: باير كروب ساينس

البلد المنتج: ألمانيا



Bayer CropScience

المحلول	معدن الاستعمال	وقت الريش	ملاحظات	مدة التحرر
العصير زجاجة مباشرة	٤ لندرهكتنار	يتم الريش عندما يصل العصير طور ٤ او ادنى	يتم رش الميد وال الأرض طرية نسبيا و خلال ٣ أيام من زراعة الأرض او الشتل و قبل أن تنبت الأعشاب	٤ - ٥
	٥ لندرهكتنار	بعد التشتت أو زراعة العصير	لا علاقة لزوجة التربة بعد الاستعمال	٥ - ٦
الفول الصويا الفول السوداني و العلف	٤ لندرهكتنار ماء ١٠٠ - ٣٠٠	بعد الزراعة و قبل مو الاعشاب	يجب أن تكون التربة رطبة بماء على الأرض الرطبة نسبيا	٣ - ٤
	٥ لندرهكتنار ٤ لندرهكتنار على العلف	٤ لندرهكتنار على العلف	الفول الصويا من رونستار على العلف	٣ - ٤
العنبر	٣ - ٤ لندرهكتنار في العلف	قبل أن تبدأ الماده في التسلاسل على أشجار العلف، و ان لا يقل عمر العلف عن ٣ شهور	الهدف الأساسي من رونستار على العلف هو مكافحة الماده، ضغط العلف و يكتفى بكميه مياه العلف	٣ - ٤ لندرهكتنار في العلف
	٣ - ٤ لندرهكتنار على العلف	٣ - ٤ لندرهكتنار على العلف	رش موجه على الماده العلف	٣ - ٤ لندرهكتنار على العلف

قابلية الخلط:

رونستار قابل للخلط مع معظم المبيدات الزراعية باستثناء ذات التركيب القلوي، وبفضل إجراء خارج خلط

صغاره قبيل الريش على مساحات كبيرة.

التخزين:

يجب حفظ الميد في عبواته الأصلية محكمة الغلق في مكان جاف وبارد بعيداً عن مصادر الحرارة ومتناول



Ronstar®_{25EC}

١ L net

١ لتر صافي

المادة الفعالة: أوكساديزون ٢٥٠ جرام/لتر

مبعد عشبى متخصص سائل مركز قابل للإستعمال

الاسم الكيميائى:

5-TERT-BUTYL-3-(2,4-DICHLORO-5-ISOPROP-OXYPHENYL)-1,3,4-OXADIAZOL-2-ONE

علامة الميد: خط

الموزع بالملكه العربيه السعوديه:

شركة الاسمهاء التجارية السعودية - الرياض: ١١٤١٢ - ٥٧٨١٢٧٩٤٧٦٥٤٢ - فاكس: ٤٧٢٤٣٩٩ - ص.ب: ٤٨١١ -

جدة: ٢٢٣٦٦٨٦ - ٤٤٧١٤٣٦٧٦ - ٧٥٤٤٧٦٧٦

الخرج: ١٠٠١ - ٣٤٤١٤٣٤

بريدة: ٣٢٨١١١١١ - ٣٢٨٥٩٩٩٩

الدمام: ٣٢٧٣٢٧٣ - ٣٢٧٣٢٧٣

وادي الموسى: ٣٢٧١٣٢ - ٣٢٧١٣٢

الجوف: ٣٢٧٣٢٦١٩ - ٣٢٧٣٢٦٨١

ش.سلام: ٣٢٧٣٢٦٨١



Ronstar EC 25 / Saudi Arabia
1-L- Label(270x150mm)

Bayer CropScience

Cyprus Office

Created by : A. Mahmoud

Code Files for Server : 05622688C

File reference : SA.05622688C(270x150mm)

Dimensions: 297X150 mm

Finish - File

Illustrator CS3

CMYK

SA.05622688C(297X150mm)