

روكيل ٤١ أس أل ROWKIL 41 SL

مبيد عشبي عام جهازي غير اختياري على هيئة سائل مركز قابل للذوبان في الماء
المادة الفعالة : جلايفوسيت في صورة ملح ايزوبروباييل ٤١ % وزن/ وزن
Active ingredient : Glyphosate (Isopropyl salt) 41 % W/W

أبعد المبيد عن متناول الأطفال

الإسعافات الأولية :

- عند بلع المبيد : يجب عرض المصاب على الطبيب فوراً .
- عند الاستنشاق : وضع المريض في الهواء الطلق ومراجعة الطبيب .
- عند ملامسة العينين : غسل العين جيداً بالماء النظيف لعدة مرات متتالية لمدة ١٥ دقيقة .
- عند ملامسة الجلد : يغسل جيداً بالماء والصابون .

رقم التسجيل بالملكة العربية السعودية : ٩٢٤ - ١٠ - ٢١٨

سعة العبوة : ٥ لتر 5 L Net Size

رقم الدفعة : Batch No. :

تاريخ الإنتاج : Prod. Date :

تاريخ الانتهاء : سنتان من تاريخ الإنتاج
2 Years From Prod. Date Exp. Date

الشركة المنتجة : شركة هونبور
البلد المنتج : الصين

الوكيل

بالمملكة العربية السعودية :
شركة الأسمدة المتحدة السعودية
Saudi United Fertilizer Co.

ص.ب ٤٨١١ الرياض ١١٤١٢ هاتف : ٤٧٨١٦٧٧ / ٤٧١٥٣٤٤
فاكس : ٤٧٢٣٣٩٩ E-mail : al-asmida@awalnet.net.sa
جدة : ٢٨٣١٦١٨١ - فونوك : ٤٤٢١٩٤٣٨
الخرج : ١٥٥١٠٤٧٤ - فون : ٧٥٤٤٠٧٦٦
بريدة : ١٣٨١١١٠١ - الفاكس : ٣٨٥٠٩٩١٩
حائل : ١٥٣٢١٧٨٣ - وادي الدواسر : ١٨٧٨٦٢٠٠
الجبيل : ٤٢٣٢١٦١٩ - ش.س.سلام : ١٢٢٨٥٨٨١



Honbor Industrial Co. Ltd.



Caution

الخواص :

روكيل ٤١ أس أل مبيد اعشاب عام جهازي غير اختياري يستعمل لمكافحة معظم أنواع الأعشاب في حقول الفاكهة والأراضي غير المزروعة .

معدلات الاستخدام :

المحصول	الأعشاب	معدل الاستخدام	ملاحظات
حقول اشجار الفاكهة	الأعشاب الحولية	٢-٤ لتر/ هكتار	يتم الرش في مرحلة النمو التنشط للأعشاب ويجب أن يكون الرش موحها نحو الأعشاب فقط والتأكد من عدم ملامسة المبيد لأوراق وسيقان الأشجار
	الأعشاب المعمرة	٤-٦ لتر/ هكتار	
الأراضي المخصصة لزراعة المحاصيل الحقلية والخضروات	الأعشاب الحولية	٣-٤ لتر/ هكتار	عدم الزراعة في الأراضي المعاملة بالمبيد قبل مرور ٣٠ يوماً من تاريخ الرش
	الأعشاب المعمرة	٤-٦ لتر/ هكتار	
جوانب الطرق والمطارات والسكك الحديدية والقنوات الري	جميع الأعشاب	٦-٨ لتر/ هكتار	

ملاحظات هامة :

- لايسمح برعي الماشية في المنطقة المعاملة إلا بعد مرور ٤٨ يوم من تاريخ الرش .
- تجنب ملامسة المبيد لأجزاء النباتات الخضراء بما فيها الجزء الخشبية الخضراء .
- عند معاملة الحشائش في قنوات الري يجب أن يكون الرش عندما تكون خالية من المياه .
- لايؤثر هذا المبيد على بدور الحشائش والمزروعات التي لم تنبت بعد .
- لاستعمل المبيد في رشاشات معدنية مجلفنة وذلك لتفاعل المبيد معها .

القابلية للخلط : يجب عدم خلطه مع أي مبيد أو سماد لأن سائل هذا الخلط يؤدي إلى تقابل تغطيته .
التخزين : يحفظ المبيد في عبواته الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن المواد الغذائية والبذور والأسمدة والأغلاف ومصدر الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس المباشرة.
الأثر على البيئة :

- سام للطيور والأسماك والحيوانات المائية والنحل .
- ضار بالإنسان والحيوان إذا ابتلع أو استنشق أو لامس الجلد والعيون .
- خطر على البيئة وقابل للاشتعال .
- لا تلوث المياه ومصادرها بالمبيد ومخلفاته .

أعراض التسمم : ارتفاع الحرارة ، تعرق ، إسهال ، غثيان .
العلاج والمضادات : لا يوجد مضاد معين معروف ويتم العلاج على حسب الأعراض الظاهرية .
احتياطات :

- اتباع التعليمات المدونة على بطاقة المعلومات بدقة .
- لبس الملابس الواقية (مئزر - حذاء - قفازات - أقنعة) عند خلط أو استعمال المبيد .
- تجنب الرش أثناء ارتفاع درجات الحرارة أو هبوب الرياح أو أثناء توقع هطول الأمطار .
- تجنب استنشاق أبخرة أو غبار المبيد .
- تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العين أو الفم .
- لا تأكل أو تشرب أو تدخن عند استعمال المبيد .
- لا تستخدم الأوعية الفارغة ويتم التخلص منها ومن بقايا المبيد بالحرق ثم الدفن في حفرة عميقة بعيداً عن المناطق السكنية .
- غسل الجسم والملابس الواقية جيداً بالماء والصابون بعد الاستعمال .
- غسل آلات الرش بالماء بعد الاستخدام .

تنبيه :

يجب اتباع تعليمات الاستعمال وطرق التخزين والاحتياطات بدقة وأن الشركة المنتجة والوكيل والموزع غير مسئولين عن نتائج سوء الاستعمال والتخزين .